

Písomná informácia pre používateľa

Nolicin 400 mg filmom obalené tablety norfloxacin

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Nolicin a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolicin
3. Ako užívať Nolicin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Nolicin
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nolicin a na čo sa používa

Nolicin je chemoterapeutikum patriace do skupiny chinolónov. Ničí baktérie, ktoré spôsobujú infekcie v ľudskom tele.

Lekár vám predpísal Nolicin, ak infekciu, ktorú máte spôsobili baktérie citlivé na norfloxacin. Je určený najmä na liečbu infekcií močových ciest, zápalu prostaty, infekčnej hnačky (cestovateľská hnačka) a gonorey (kvapavky).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolicin

Neužívajte Nolicin

- ak ste alergický na norfloxacin, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 - ak ste tehotná alebo dojčíte,
 - ak ste niekedy mali zápal a/alebo roztrhnutie šľachy spôsobené užívaním fluórchinolónových antibiotík (pozri časti „Upozornenia a opatrenia“ a „Možné vedľajšie účinky“).
- Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov), v období rastu nesmú užívať Nolicin.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako užijete tento liek

Neužívajte antibiotiká obsahujúce chinolón/fluórchinolón vrátane Nolicinu, ak sa u vás v minulosti pri užívaní chinolónu alebo fluórchinolónu vyskytol akýkoľvek závažný vedľajší účinok. V takom prípade o tom čo najskôr informujte svojho lekára.

Predtým, ako začnete užívať Nolicin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak ste sa narodili s predĺženým QT intervalom alebo máte v rodinnej anamnéze predĺžený QT interval (viditeľný na EKG, elektrický záznam srdca).
- ak máte nerovnováhu solí v krvi (najmä nízku hladinu draslíka alebo horčíka),
- ak máte veľmi pomalý tep (nazývaný „bradykardia“).
- ak máte slabé srdce (srdcové zlyhanie), ak ste v minulosti prekonali srdcový záchvat (infarkt myokardu).
- ak ste žena alebo starší pacient alebo ak užívate iné lieky, ktoré spôsobujú abnormálne zmeny EKG (pozri časť „Iné lieky a Nolicin“).
- ak vám bolo diagnostikované rozšírenie alebo vydutie veľkej krvnej cievy (aneuryzma aorty alebo periférna aneuryzma veľkej cievy).
- ak ste niekedy mali trhlinu v stene veľkej krvnej cievy (disekciu aorty).
- ak vám bola diagnostikovaná nedomykavosť srdcových chlopní (spätný návrat krvi cez srdcové chlopne).
- ak sa vo vašej rodine vyskytla aneuryzma aorty alebo disekcia aorty alebo vrodené ochorenie srdcových chlopní alebo iné rizikové faktory a ochorenia spôsobujúce náchylnosť na ne - predispozičné ochorenia (napríklad ochorenia spojivového tkaniva, ako je Marfanov syndróm alebo Ehlersov-Danlosov syndróm, Turnerov syndróm, Sjögrenov syndróm [zápalové autoimunitné ochorenie] alebo poruchy ciev, ako je Takayasuova arteritída, obrovskobunková arteritída, Behcetova choroba, vysoký krvný tlak alebo známa ateroskleróza, reumatoidná artritída [ochorenie kĺbov] alebo endokarditída [infekčné ochorenie srdca]).
- ak máte epilepsiu alebo iné ochorenie centrálného nervového systému (najmä také, pri ktorom sa môžu objaviť záchvaty), povedzte to svojmu lekárovi. V takýchto prípadoch sa môžu častejšie objaviť vedľajšie účinky liečby.
- ak sa u vás zistila psychická porucha alebo je na ňu podozrenie, alebo sa u vás vyskytli halucinácie alebo zmätenosť, užívanie norfloxacinu môže viesť k zhoršeniu vašich príznakov.
- ak máte cukrovku. Chinolónové antibiotiká môžu spôsobiť zvýšenie hladiny cukru v krvi nad normálne hodnoty (hyperglykémia), alebo zníženie hladiny cukru v krvi pod normálne hodnoty, čo môže v závažných prípadoch viesť k strate vedomia (hypoglykemická kóma) (pozri časť 4). To je dôležité v prípade osôb, ktoré majú cukrovku. Ak máte cukrovku, je potrebné dôkladne sledovať hladinu cukru v krvi.
- ak máte myasténiu gravis (typ svalovej slabosti). Nolicin môže zhoršiť príznaky myasténie gravis, čo môže viesť k život ohrozujúcej slabosti dýchacích svalov.
- ak máte nedostatok enzýmu G6FD (glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza), môže u vás dôjsť k nadmernému rozpadu červených krviniek (hemolýza).
- ak máte poruchu funkcie obličiek, lekár vám náležite zníži dávku lieku.

Počas liečby Nolicinom:

Reakcie z precitlivenosti

Norfloxacin môže spôsobiť závažné, potenciálne smrteľné reakcie z precitlivenosti (anafylaktické a anafylaktoidné reakcie) po podaní počiatočnej dávky (pozri časť 4. „Možné vedľajšie účinky“). Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia, okamžite prestaňte Nolicin užívať a vyhľadajte lekársku pohotovosť alebo svojho lekára, pretože môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie.

V zriedkavých prípadoch boli hlásené záchvaty u pacientov užívajúcich norfloxacin.

Riziko je zvýšené u pacientov s poškodením centrálného nervového systému (predovšetkým s epilepsiou a inými stavmi, ktoré môžu vyvolať záchvaty). Ak sa u vás objavia záchvaty, prestaňte Nolicin užívať a okamžite vyhľadajte lekára.

Počas liečby Nolicinom sa u vás môže vyvinúť precitlivenosť na slnečné žiarenie a umelé ultrafialové svetlo. Preto sa počas liečby vyhýbajte nadmernému vystavovaniu sa priamemu slnečnému žiareniu a umelému ultrafialovému svetlu. Ak sa u vás vyskytne precitlivenosť na svetlo, vyhľadajte svojho lekára, ktorý prehodnotí liečbu.

Ak sa vám začne zhoršovať zrak alebo ak sa vám zdá, že máte inak ovplyvnené oči, okamžite sa obráťte na očného lekára.

Počas dlhodobej liečby norfloxacinom môže dôjsť ku kryštalizácii liečiva v moči (kryštalúria) (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“). Je preto dôležité, aby ste počas liečby pili dostatok tekutín. Spýtajte sa lekára, aké množstvo tekutín je pre vás primerané.

Zriedkavo sa môže vyskytnúť bolesť a opuch kĺbov a zápal alebo natrhnutie šliach. Riziko výskytu týchto príznakov je u vás zvýšené, ak ste starší pacient (vo veku viac ako 60 rokov), máte transplantovaný orgán, máte problémy s obličkami alebo ak sa liečite kortikosteroidmi. Zápal a natrhnutie šliach sa môžu vyskytnúť už v priebehu prvých 48 hodín liečby a dokonca aj niekoľko mesiacov po ukončení liečby Nolicinom. Pri prvom prejave bolesti alebo zápalu šľachy (napríklad v členku, zápästí, lakti, ramene alebo kolene), prestaňte užívať Nolicin, kontaktujte svojho lekára a bolestivú oblasť udržiavajte v pokoji. Vyhňte sa akejkoľvek nadbytočnej fyzickej aktivite, pretože to môže zvýšiť riziko natrhnutia šľachy.

Ak pocítite náhlu silnú bolesť brucha, hrudníka alebo chrbta, ktorá môže byť príznakom aneuryzmy alebo disekcie aorty, okamžite sa obráťte na lekársku pohotovosť. Riziko môže byť vo vašom prípade vyššie, ak ste liečený systémovými kortikosteroidmi.

Ak sa u vás vyskytne náhla dýchavičnosť, predovšetkým keď ležíte v posteli, alebo spozorujete opuch členkov, chodidiel alebo brucha, prípadne spozorujete novovzniknuté búšenia srdca (pocitovanie rýchleho alebo nepravidelného srdcového tepu), ihneď o tom informujte lekára.

Zriedkavo sa u vás môžu vyskytnúť príznaky poškodenia nervov (neuropatia), napríklad bolesť, pocit pálenia, brnenie, necitlivosť a/alebo slabosť najmä chodidiel a nôh alebo dlaní a rúk. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, prestaňte užívať Nolicin a ihneď kontaktujte svojho lekára, aby sa predišlo rozvinutiu potenciálne nezvratného stavu.

Dlhodrvajúce, invalidizujúce a potenciálne nezvratné závažné vedľajšie účinky

Používanie antibiotík obsahujúcich chinolón/fluórchinolón vrátane Nolicinu sa spájalo s výskytom veľmi zriedkavých, avšak závažných vedľajších účinkov, z ktorých niektoré sú dlhodrvajúce (pokračujúce mesiace až roky), invalidizujúce alebo potenciálne nezvratné. Tieto vedľajšie účinky zahŕňajú bolesť šliach, svalov a kĺbov horných a dolných končatín, ťažkosti s chôdzou, neobvyklé pocity ako mravčenie, brnenie, pocit šteklenia, necitlivosť alebo pocit pálenia (parestézia), poruchy zmyslov vrátane poruchy zraku, chuti, čuchu a sluchu, depresia, porucha pamäti, silná únava a závažné poruchy spánku.

Ak sa u vás po použití Nolicinu vyskytne ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, bezodkladne kontaktujte svojho lekára predtým, ako budete pokračovať v liečbe. Spolu s lekárom rozhodnete, či budete pokračovať v liečbe, pričom zvažíte aj antibiotiká inej triedy.

Pseudomembranózna kolitída

Výskyt závažnej a pretrvávajúcej hnačky počas alebo po liečbe môže byť dôkazom veľmi zriedkavo pozorovanej pseudomembranózne kolitídy (závažný zápal hrubého čreva). Ak sa u vás vyskytne závažná a pretrvávajúca hnačka ihneď kontaktujte svojho lekára predtým, ako budete pokračovať v liečbe. Neužívajte lieky spomaľujúce pohyb čriev (antipropulzíva).

Cholestatická hepatitída

Cholestatická hepatitída (zápal pečene) je často hlásená pri užívaní norfloxacinu (pozri časť 4. “Možné vedľajšie účinky”). Ak sa u vás objavia prejavy ochorenia pečene ako je nechutenstvo, žltacka, tmavý moč, svrbenie alebo bolesť brucha prestaňte Nolicin užívať a ihneď vyhľadajte lekára.

Iné lieky a Nolicin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate iné lieky, ktoré môžu ovplyvňovať rytmus vášho srdca musíte to povedať vášmu lekárovi: lieky, ktoré patria do skupiny antiarytmík (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklické antidepresíva, niektoré lieky proti mikrobiálnym infekciám (ktoré patria do skupiny makrolidových antibiotík), niektoré antipsychotiká (lieky na liečbu schizofrénie).

Ak užívate lieky na pálenie záhy, antacidá, sukralfát, lieky obsahujúce železo, hliník, bizmut, horčík, vápnik alebo zinok, vstrebávanie Nolicinu sa zníži. Preto sa odporúča užitie Nolicinu dve hodiny pred týmito liekmi.

Ak počas liečby Nolicinom užívate teofylín alebo cyklosporín, môžu sa z dôvodu ich zvýšených hladín v krvi objaviť vedľajšie účinky. Lekár vám bude kontrolovať množstvo týchto liekov v krvi a môže vám predpísať nižšiu dávku.

Súbežné užívanie Nolicinu a liekov zabráňujúcich zrážaniu krvi môže zosilniť účinok týchto liekov a môže sa objaviť krvácanie.

Probenecid (liek používaný na liečbu dny a artritídy s dnou) znižuje vylučovanie norfloxacinu močom, ale neovplyvňuje jeho koncentráciu v krvi.

Didanozín, liek používaný na infekcie HIV, sa nemá podávať súbežne s norfloxacinom alebo do dvoch hodín pred alebo po podaní norfloxacinu, pretože ovplyvňuje jeho vstrebávanie a spôsobuje nižšie hladiny norfloxacinu v krvi a moči.

Zistilo sa, že chinolóny a tiež norfloxacin zabráňujú metabolizmu kofeínu. Počas liečby norfloxacinom sa nemajú užívať lieky obsahujúce kofeín (napr. niektoré analgetiká).

Fenbufén, liek na reumatizmus môže pri súbežnom užívaní s chinolónmi (vrátane norfloxacinu) spôsobiť záchvaty. Je preto potrebné vyhnúť sa súbežnému užívaniu chinolónov a fenbufénu.

Súbežné užívanie Nolicinu a kortikosteroidov môže zvýšiť riziko zápalu šliach alebo natrhnutia šliach.

Účinok niektorých liekov na zníženie hladiny cukru v krvi (sulfonylmočovina) sa môže počas liečby Nolicinom zvýšiť.

Neužívajte Nolicin spolu s nitrofurantoinom (liek proti črevným infekciám), pretože sa tým znižuje účinok oboch liekov.

Nolicin a jedlo, nápoje a alkohol

Nolicin môžete užívať nalačno alebo počas jedla. Neužívajte ho spolu s mliekom alebo jogurtom, pretože tekuté mliečne výrobky znižujú množstvo norfloxacinu, ktoré sa dostane do krvi. Užívajte Nolicin jednu hodinu pred alebo dve hodiny po mliečnom jedle. Požívanie alkoholu sa počas liečby neodporúča.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nemožno vylúčiť riziko vedľajších účinkov na plod. Ak ste tehotná, lekár vám môže predpísať liek len výnimočne, keď prínos lieku pre vás prevýši riziko pre plod.

Počas užívania Nolicinu nedojčíte.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nolicin môže znížiť ostražitosť, a preto by ste mali byť opatrný pri vedení vozidiel a obsluhu strojov, kým nezistíte, ako naň vaše telo reaguje. Vedľajšie účinky sa pri súbežnom požívaní alkoholu zosilňujú.

Nolicin obsahuje azofarbivo oranžovú žlt' FCF (E110) a sodík

Azofarbivo oranžová žlt' FCF (E110) môže vyvolať alergické reakcie.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Nolicin

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Nemeňte si dávkovanie a neprerušujte liečbu bez toho, aby ste sa poradili so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Lekár vám na základe vašej choroby upraví dávkovanie a dĺžku liečby.

Tablety sa môžu užívať na prázdny žalúdok alebo počas jedla. Každú tabletu zapite pohárom vody alebo čaju. Uistite sa, že počas liečby prijímate dostatok tekutín. (pozri časť 2 „Upozornenia a opatrenia“).

Nolicin sa má užívať v dávkach 400 mg dvakrát denne. Liečba trvá od 3 do 14 dní, pri bakteriálnom zápale prostaty niekoľko týždňov.

Použitie u detí a dospievajúcich

Deti a dospievajúci v období rastu nesmú užívať Nolicin.

Ak máte poruchu funkcie obličiek, váš lekár vám náležite upraví dávkovanie.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac Nolicinu, ako máte

Príliš veľké dávky môžu spôsobiť nevoľnosť, vracanie, hnačku, v ťažších prípadoch taktiež závrat, únavu, kŕče a zmätenosť.

Ak ste užili väčšiu dávku lieku ako ste mali, okamžite sa poradte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Nolicin

Ak ste zabudli užiť tabletu, užite ju hneď ako si na to spomeniete, pokiaľ sa neblíži čas užitia ďalšej dávky.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Nolicin

Ak ukončíte užívanie lieku príliš skoro, ochorenie sa môže vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:

Časté: môžu postihovať až 1 z 10 osôb

- cholestatická hepatitída (typ zápalového ochorenia pečene), zápal pečene
- vyrážka
- rozpad svalových buniek (rabdomyolýza), ktorý sa môže prejavovať slabosťou, citlivosťou alebo bolesťou svalov, spojenou s vysokou teplotou, tmavohnedým sfarbením moču, môže viesť k problémom s obličkami a byť život ohrozujúci.

Menej časté: môžu postihovať až 1 zo 100 osôb

- znížený počet (leukopénia, neutropénia, trombocytopénia) alebo zvýšený počet (eozinofília) určitých krvných buniek, dlhší protrombínový čas (znížená schopnosť zrážania krvi)
- bolesť hlavy, závraty, ospalosť
- bolesť brucha a kŕče, pálenie záhy, hnačka,
- kryštáliky v moči, ktoré môžu spôsobovať bolesť alebo nepríjemný pocit pri močení (kryštalúria)
- zvýšené hladiny pečeneých enzýmov

Zriedkavé: môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb

- nedostatok červených krviniek spôsobený ich nadmerným rozpadom (hemolytická anémia) prejavujúca sa žltáčkou, únavou a niekedy je spojená s deficitom glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy
- anafylaktické, anafylaktoidné reakcie – náhle reakcie z precitlivenosti, ktoré sa prejavujú opuchom tváre, pier, jazyka, dýchacích ciest (sťažené dýchanie, chrapot), poklesom krvného tlaku (pocit na odpadnutie), niekedy nevoľnosťou, hnačkou, vracaním, vyrážkou
- zmeny nálady, depresia, pocit úzkosti, nervozita, podráždenosť, eufória (povznesená nálada), problémy s orientáciou, halucinácie (počutie, videnie, cítenie vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú), zmätenosť, psychické poruchy a psychotické reakcie (napríklad halucinácie, bludy, zmeny správania a pociťovania vlastnej osoby)
- mravčenie alebo znecitlivenie dlaní a chodidiel (parestézia), nespavosť, poruchy spánku, poškodenie nervov - polyneuropatia vrátane Guillan-Barré syndrómu a záchvaty
- poruchy zraku, zvýšená tvorba slz
- hučanie v ušiach (tinnitus)
- krvácanie do kože - drobné krvné výrony veľkosti vpichu špendlíka (petechie) až tvorba veľkých podliatin spojené so zápalom krvných ciev
- vracanie, strata chuti do jedla
- závažný zápal hrubého čreva (pseudomembranózna kolitída), prejavuje sa závažnou alebo pretrvávajúcou hnačkou, ktoré môže obsahovať krv alebo hlien, horúčkou
- zápal podžalúdkovej žľazy
- závažné kožné reakcie. Môžu sa prejaviť ako červenasté ohraničené škvrny alebo okrúhle fľaky často s pľuzgierom uprostred, olupovaním kože, vredmi v ústach, nose, hrdle, na pohlavných orgánoch a v očiach a môžu byť sprevádzané horúčkou a príznakmi podobnými chrípke (exfoliatívna dermatitída, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), multiformný erytém (Stevensov-Johnsonov syndróm))
- citlivosť na slnečné žiarenie (fotosenzitivita)
- svrbenie a žihľavka
- opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla s ťažkosťami pri dýchaní alebo prehĺtaní (angioedém)
- zápal šľachy, zápal blany, ktorá tvorí puzdro kĺbu, svalová bolesť a/alebo bolesť kĺbov, zápal kĺbov
- možné zhoršenie svalového ochorenia myasténia gravis
- zápal obličiek
- zápal pošvy spôsobený kvasinkami
- únava
- zvýšené hladiny močoviny a kreatinínu v sére
- znížený počet červených krviniek (znížené hladiny hematokritu).

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb

- pretrhnutie šľachy (napr. Achillova šľacha), vyskytuje sa spolupôsobením s ďalšími škodlivými faktormi

Neznáme: frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov

- reakcie z precitlivosti (žihľavka, vyrážka, svrbenie)
- zrýchlenie srdcového rytmu (tachykardia), život ohrozujúce nepravidelnosti srdcového rytmu, poruchy srdcového rytmu (nazývané „predĺženie QT intervalu“, viditeľné na EKG zázname srdcovej činnosti)
- žltáčka
- Syndróm spojený so zníženým vylučovaním vody a nízkymi hladinami sodíka (z angl. syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone, SIADH)
- strata vedomia spôsobená závažným znížením hladiny cukru v krvi (hypoglykemická kóma). Pozri časť 2.

Podávanie antibiotík obsahujúcich chinolón a fluórchinolón sa spájalo, v niektorých prípadoch bez ohľadu na už existujúce rizikové faktory, s veľmi zriedkavými prípadmi dlhotrvajúcich (trvajúcich až mesiace alebo roky) alebo trvalých vedľajších účinkov, ako napríklad zápal šľachy, natrhnutie šľachy, bolesť kĺbov, bolesť končatín, ťažkosti s chôdzou, neobvyklé pocity ako mravčenie, trpnutie, pocit šteklenia, pocit pálenia, necitlivosť alebo bolesť (neuropatia), únava, porucha pamäti a koncentrácie, účinky na duševné zdravie (ktoré môžu zahŕňať poruchy spánku, úzkosť, záchvaty paniky, depresiu a myšlienky na samovraždu), ako aj porucha sluchu, zraku, chuti a čuchu.

U pacientov užívajúcich fluórchinolóny boli hlásené prípady rozšírenia a oslabenia steny aorty alebo natrhnutia steny aorty (aneuryzma a disekcia), ktoré môžu viesť k prasknutiu steny aorty a môžu byť smrteľné, a prípady nedomykavosti srdcových chlopní. Pozri tiež časť 2.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia** uvedené v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Nolicin

Uchovávať pri teplote do 25 ° C.

Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nolicin obsahuje

- Liečivo je norfloxacin.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg norfloxacinu.
- Ďalšie zložky sú povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, stearát horečnatý, čistená voda v jadre tablety, hypromelóza, mastenec, oxid titaničitý (E171), oranžová žltá FCF (E110) a propylénglykol (E1520) vo filmovom obale.

Ako vyzerá Nolicin a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú oranžové, okrúhle, mierne bikonvexné s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Obsah balenia: 20 filmom obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2025.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (www.sukl.sk).